ISSN : 2088-5113 (Printed)
ISSN : 2598-0327 (electric)

PASPALUM : Jurnal Ilmiah Pertanian

Vol. 9 No. 1 Bulan Maret Tahun 2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.35138/paspalum.v9i1.194>

Interval Waktu Pemberian Nutrisi Terhadap Produksi Tanaman Selada Hijau (*Lactucasativa L*) Varietas New Grand Rapid Pada Sistem Aeroponik

Rommy Andhika Laksono
Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang
rommy.laksono@faperta.unsika.ac.id

(Received: 10-10-2020; Reviewed: 25-11-2020; Published: 30-03-2021)

ABSTRACT

Lettuce production in Indonesia is still low, so the demand for lettuce cannot be fulfilled. Lettuce production can be increased with aeroponic systems because aeroponic systems can be carried out in various places including urban areas and areas that have high land conversion.. The purpose of this study was to study and obtain the best time intervals of nutrition in lettuce New Grand Rapid varieties with the Aeroponic System. This research was conducted in a screen house in Leuwimalang Village, Cisarua, Bogor Regency, West Java from August to November 2019. The study used a single factor randomized block design (RBD), consisting of 6 treatments with 5 replications, so that there were 30 experimental units. t1 = 30 seconds (on): 5 minutes (off); [t2 = 30 seconds (on): 10 minutes (off)]; [t3 = 30 seconds (on): 15 minutes (off)]; [t4 = 30 seconds (on): 20 minutes (off)]; [t5 = 30 seconds (on): 25 minutes (off)]; [t6 = (Non Stop)]. The provision of nutrition with different time intervals in the aerophonic system gave different effects on the average plant height, number of leaves, stem diameter, leaf area and fresh weight per lettuce plant, and continuous nutrition treatment (Non Stop) gave the results of fresh weight the highest was 203.10 g

Keywords: *Aeroponics; Time Interval; Nutrition; Green Lettuce.*

ABSTRAK

Produksi selada di Indonesia masih rendah sehingga permintaan selada belum dapat terpenuhi. Produksi selada dapat ditingkatkan dengan sistem aeroponik karena sistem aeroponik dapat dilakukan di berbagai tempat termasuk wilayah perkotaan dan wilayah yang memiliki alih fungsi lahan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mendapatkan interval waktu pemberian nutrisi terbaik pada tanaman selada varietas New Grand Rapid dengan Sistem Aeroponik. Penelitian ini dilaksanakan di screen house yang berada di Desa Leuwimalang, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan Agustus sampai November 2019. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktor tunggal, terdiri atas 6 perlakuan dengan 5 kali ulangan, sehingga terdapat 30 unit percobaan. [t1= 30 detik (on) : 5 menit (off)]; [t2= 30 detik (on) : 10 menit (off)]; [t3= 30 detik (on) : 15 menit (off)]; [t4= 30 detik (on) : 20 menit (off)]; [t5= 30 detik (on) : 25 menit (off)]; [t6= (Non Stop)]. Pemberian nutrisi dengan interval waktu berbeda pada sistem aerophonik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, luas daun dan bobot segar per tanaman tanaman selada, dan perlakuan pemberian nutrisi terus menerus (Non Stop) memebrikan hasil bobot segar tertinggi sebesar 203,10 g

Keywords: Aeroponik; Interval Waktu; Nutrisi; Selada Hijau

PENDAHULUAN

Peningkatan produksi sayuran perlu didukung dengan berbagai usaha, salah satunya dengan penerapan sistem pertanian non konvensional salah satunya adalah Aeroponik. Aeroponik adalah suatu sistem budidaya dengan prinsip akar menggantung di udara dan nutrisi diberikan dalam bentuk kabut ke daerah perakaran sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Aeroponik merupakan metode yang bagus karena menghasilkan butiran nutrisi halus berupa kabut. (Subandi, A, Widodo, M, 2016). Keunggulan aeroponik yaitu oksigenasi dari tiap butiran kabut halus sehingga respirasi akar lancar dan menghasilkan banyak energi (Sianipar, et al. 2017). Pemanfaatan sistem aeroponik memiliki kelebihan secara khusus yaitu kombinasi larutan nutrisi dapat tersirkulasi dalam bentuk kabut pada akar tanaman serta volume larutan hara yang dibutuhkan lebih rendah. Kelebihan lain dari sistem ini yaitu ketersediaan udara yang optimal karena akar tanaman yang menggantung sehingga tanaman tumbuh dengan optimal, umur panen menjadi lebih singkat dan penggunaan nutrisi yang efisien. Namun kekurangan sistem tersebut yaitu biaya investasi cukup mahal.

Salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan secara aeroponik yaitu selada. Selada mempunyai nilai tambah terhadap manfaat kesehatan yang mengandung gizi cukup tinggi terutama kandungan mineralnya (Sastradihardja, 2011). Di Indonesia selada banyak dimanfaatkan untuk salad, lalap, dan sebagai pelengkap pada makanan cepat saji seperti hamburger. Selada memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Sayuran ini mengandung air yang kaya karbohidrat, serat, dan protein. (Novriani, 2014 dalam Afdilla, 2018)

Permintaan ekspor selada di Indonesia masih belum dapat terpenuhi karena produksi selada di Indonesia masih rendah serta permintaan pasar dalam negeri yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, ekspor selada pada tahun 2018 sebanyak 47.920 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 55.710 ton (Samadi, 2019). Salah satu cara untuk mencukupi permintaan ekspor

selada yaitu dengan budidaya selada sistem aeroponik. Sistem ini lebih unggul dibandingkan sistem konvensional serta dapat dilakukan pada wilayah yang memiliki tingkat alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 terjadi alih fungsi lahan pertanian di pulau jawa sebanyak 27.000 hektar.

Sistem aeroponik untuk peningkatan produksi selada dapat dilakukan dengan interval waktu pemberian nutrisi dengan cara pengkabutan pada daerah perakaran tanaman. Subandi dan widodo (2016), bahwa penyemprotan nutrisi selama 30 detik dan waktu kondisi mati 15 menit dapat mensuplai nutrisi sampai ke daerah perakaran tanaman, menghasilkan pertumbuhan yang signifikan setiap harinya dengan rata-rata tinggi tanaman 2 mm dan untuk panjang daun 1 mm.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mendapatkan interval waktu pemberian nutrisi terbaik pada tanaman selada varietas New Grand Rapid dengan Sistem Aeroponik.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di *screen house* yang berada di Desa Leuwimalang, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan Agustus sampai November 2019. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktor tunggal, terdiri atas 6 perlakuan dengan 5 kali ulangan, sehingga terdapat 30 unit percobaan. [t1= 30 detik (on) : 5 menit (off)]; [t2= 30 detik (on) : 10 menit (off)]; [t3= 30 detik (on) : 15 menit (off)]; [t4= 30 detik (on) : 20 menit (off)]; [t5= 30 detik (on) : 25 menit (off)]; [t6= (Non Stop)]. Unit percobaan yaitu sterofoam berukuran panjang 50 cm, tinggi 35 cm, lebar 35 cm, kemudian tutup sterofoam dilubangi sebanyak 6 lubang tanam untuk nettpot dengan jarak antar lubang 20cm x 20cm, untuk mengalirkan nutrisi menggunakan pompa aquarium dan pipa paralon ukuran ½ inch serta untuk pengkabutan nutrisi pada perakaran menggunakan 6 buah nozel pada paralon ½ inch tersebut, kemudian *timer* diatur sesuai masing-masing perlakuan. Percobaan menggunakan nutrisi AB Mix dengan nilai EC

(*Electrical Conductivity*) sebesar 1 – 2,5 mS/cm³, sedangkan varietas selada hijau yang digunakan adalah *New Grand Rapid*. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan uji lanjut dengan uji jarak berganda *Duncan* pada taraf 5%. Jumlah tanaman untuk tiap plot perlakuan sebanyak 6 tanaman. Parameter pengamatan yaitu pengamatan penunjang (suhu dan kelembaban relatif *screen house*), pengamatan utama (tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, luas daun, dan bobot segar)

(a) Instalasi Unit percobaan terbuka

(b) instalasi dalam *screen house*

(c) *screen house* penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan Penunjang

Rerata suhu di dalam *screen house* selama percobaan berlangsung berkisar 23,0°C -26,8 °C dengan rerata suhu 25,30 °C. Menurut Darmawan (1997) pertumbuhan selada *Grand Rapid* akan optimal pada kisaran suhu udara (25-26) °C, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Ogbodo., et.al (2010) pertumbuhan selada signifikan lebih tinggi di daerah bersuhu (13,90-18,57) °C. (Gambar.1)

Gambar 1. Grafik suhu selama percobaan

Rerata kelembaban relatif di dalam *screen house* berkisar 85%-92% dengan rerata 88,14 %. Menurut Rowe dan C. Paul (2014) kelembaban yang baik untuk tanaman selada adalah (70-80)%, sedangkan Ogbodo., et.al (2010), pertumbuhan selada akan signifikan dengan kelembaban udara berkisar (51,00-90,93)%. (Gambar. 2)

Gambar 2. Grafik Kelembaban relatif selama percobaan

Pengamatan Utama

Tinggi Tanamn

Data hasil analisis menunjukkan bahwa interval waktu pemberian nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata tinggi tanaman selada hijau umur 42 hst pada

sistem Aeroponik. Pemberian nutrisi terus menerus (*NonStop*) (t6) mampu memberikan tinggi tanaman tertinggi sebesar 29,40 cm, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Pengkabutan nutrisi dan air secara terus menerus mampu menyuplai ke butuhan air dan hara pada daerah perakaran tanaman dengan optimal sehingga pertumbuhan tinggi tanaman jauh lebih baik dibandingkan pemberian air dan hara secara berselang. Lingga (2007) yang menyatakan bahwa apabila kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi maka tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Jumlah Daun

Data hasil analisis menunjukkan bahwa interval waktu pemberian nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata jumlah daun selada hijau umur 42 hst pada sistem Aeroponik. Perlakuan t6 mampu memberikan jumlah daun tertinggi yaitu 15,22 lembar, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Pengkabutan nutrisi dan air secara terus menerus pada daerah perakaran tanaman mampu mencukupi

kebutuhan unsur N pada fase vegetatif, unsur N merupakan unsur penting dalam pembentukan sel dan kloroplas sehingga kandungan unsur N yang optimal dapat meningkatkan laju pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman pada sistem aeroponik. Akasiska et. al (2014) Pemberian nutrisi yang sesuai akan mempercepat laju pertumbuhan daun, karena kebutuhan tanaman akan unsur hara yang tercukupi sangat berperan besar dalam fase vegetatif.

Pengkabutan air dan nutrisi secara periode tertentu (interval) berpeluang besar menimbulkan tanaman kekurangan air dan nutrisi dalam menyusun kloroplas sehingga akan mengganggu bahkan menurunkan jumlah daun seperti perlakuan selain (t6) Pemberian nutrisi terus menerus (*NonStop*). Embarsari et.al (2015), semakin besar kekurangan air maka semakin besar pula nilai intensitas kerusakan daun yang merusak kloroplas sehingga dapat menyebabkan daun akan mengalami klorosis yang menyebabkan penurunan jumlah daun pada tanaman.

Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Diameter Batang, Luas Daun, dan Bobot Segar per Tanaman Selada Hijau (*Lactuca Sativa* L) Varietas New Grand Rapid Umur 42 Hst dengan Interval Waktu Pemberian Nutrisi pada Sistem Aeroponik.

Perlakuan	Umur 42 Hari Setelah Tanam (HST)				
	Tinggi Tanaman (cm)	Jumlah Daun (Buah)	Diameter Batang (mm)	Luas Daun (cm ²)	Bobot Segar (g)
t1	16,08 b	7,13 b	6,79 b	92,95 b	86 b
t2	18,15 b	7,18 b	6,88 b	108,88 b	90,7 b
t3	18,08 b	7,87 b	8,33 b	128,92 b	103,8 b
t4	17,04 b	7,83 b	7,56 b	120,20 b	120,8 b
t5	18,45 b	8,33 b	8,62 b	122,86 b	127,4 b
t6	29,40 a	15,22 a	14,11 a	183,59 a	203,1 a
KK (%)	16,76	14,65	13,44	13,75	16,39

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5%.

Gambar 3. Tanaman selada Umur 42 HST

Gambar 4. Perlakuan t6 umur 42 HST

Diameter Batang.

Data hasil analisis menunjukkan bahwa interval waktu pemberian nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata diameter batang selada hijau umur 42 hst pada sistem Aeroponik. Perlakuan t6 mampu memberikan diameter batang tertinggi sebesar 14,11 mm, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Pengkabutan nutrisi dan air secara terus menerus pada daerah perakaran mampu mencukupi unsur hara makro esensial khususnya unsur P dan K yang dibutuhkan tanaman sehingga mampu mengoptimalkan pembelahan sel batang yang mengakibatkan diameter batang berkembang dengan optimal dibandingkan dengan pemberian nutrisi dan air secara berselang pada sistem aeroponik. Menurut Mas'ud (2009) nutrisi yang tersedia dan tepat akan memberikan hasil pertumbuhan yang optimal pada pertumbuhan batang tanaman selada merah secara hidroponik.

Luas Daun

Data hasil analisis menunjukkan bahwa interval waktu pemberian nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata luas daun selada hijau umur 42 hst pada sistem Aeroponik. Perlakuan t6 mampu memberikan luas daun tertinggi sebesar 183,59 cm², berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Pengkabutan nutrisi dan air secara terus menerus pada daerah perakaran mampu menyuplai kebutuhan hara yang dibutuhkan dalam pembentukan daun lebih optimal dibandingkan dengan pengkabutan berselang, semakin banyak jumlah daun dan ukuran daun maka

semakin luas, luas daunnya. Luas daun dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran daun, semakin banyak jumlah daun dan ukurannya yang semakin lebar maka luas daun semakin besar. Prastowo., *et. al* (2013).

Bobot Segar

Data hasil analisis menunjukkan bahwa interval waktu pemberian nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata bobot segar tanaman selada hijau pada sistem aeroponik. Perlakuan t6 mampu memberikan bobot segar tertinggi sebesar 203,10 g, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Peningkatan bobot segar tanaman berbanding lurus dengan peningkatan komponen pertumbuhan diantaranya tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan luas daun. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis, jika fotosintesis berjalan dengan optimal maka fotosintat yang dihasilkan juga maksimal. Hasil fotosintat tersebut akan digunakan untuk pembentukan organ dan jaringan dalam tanaman seperti daun, batang, dan biomasa tanaman itu sendiri. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh iklim mikro baik suhu dan kelembaban yang sesuai untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Menurut Syahputra *et al.*, (2014) tinggi tanaman berkaitan dengan jumlah daun, sehingga semakin banyak jumlah daun dan semakin tinggi tanaman maka bobot segar tanaman akan meningkat. Menurut Darmawan (1997) pertumbuhan selada Grand Rapid akan optimal pada kisaran suhu udara (25-26) °C, sehingga pertumbuhan tanaman berjalan dengan baik. Dartius (1990), yang menyatakan

bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor intern dan ekstern.

KESIMPULAN

Pemberian nutrisi dengan interval waktu berbeda pada sistem aerophonik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, luas daun dan bobot segar per tanaman tanaman selada, dan perlakuan pemberian nutrisi terus menerus (*Non Stop*) memberikan hasil bobot segar tertinggi sebesar 203,10 g

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Faperta UNSIKA, Anggun Pertiwi, S.Pd., M.Pd., serta Jurnal PASPALUM UNWIM yang memberikan kesempatan dalam mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdilla, Bismi. 2018. Analisis Hasil Dan Laju Serapan Hara N, P, K Pada Tanaman Selada (*Lactuca Sativa* L.) Sistem Akuaponik Dengan Berbagai Kotoran Ikan. Skripsi Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- Akasiska., R, Samekto., dan Siswadu. 2014. Pengaruh Konsentrasi Nutrisi dan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Sawi Pakcoy (*Brassica parachinensis*) Sistem Hidroponik Vertikultur. *Jurnal Inovasi Pertanian*. Vol. 13, No.2 : (151-155)
- Darmawan, I.A. 1997. Pengaruh Topoklimat terhadap Produksi dan Kualitas Selada (*Lactuca sativa* L.). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Skripsi.
- Dartius. 1990. Fisiologi Tumbuhan 2. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. 125 hlm.
- Embarsari, R. P., Taofik, A., dan Frasetya, B. (2015). Pertumbuhan dan Hasil Seledri (*Apium Graveolens* L.) pada Sistem Hidroponik Sumbu dengan Jenis Sumbu dan Media Tanam Berbeda. *Jurnal Agro*. Vol. 2, No.2 : (41–48).
- Gomez, K.A., dan Gomes, A.A. 2010. Prosedur Statistik untuk Penelitian. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lingga, Pinus. 2004. *Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Mas'ud, H. 2009. Sistem Hidroponik dengan Nutrisi dan Media Tanam Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Selada. *Jurnal Media Litbang Sulteng*. Vol 2, No. 2 : (131-136)
- Prawoto Benny Rahardian, dan Kartika Juang Gema. 2016. Pengelolaan Aspek Produksi Dan Pasca Panen Sayuran Daun Secara Aeroponik Dan Hidroponik. 2016
- Samadi, Budi. 2019. *Rahasia Budidaya Selada Teknik Budidaya Pertanian Organik dan Anorganik*. Jakarta. Pustaka Mina.
- Sastradihardja S. 2011. Sukses Bertanam Secara Organik. Jakarta: Angkasa. 74 hlm.
- Sianipar., dkk. 2017. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tiga Jenis Tanaman Sayuran Dengan Sistem Aeroponik.
- Subandi, Ayub dan Widodo, Muhammad. 2016. Rancang Bangun Sistem Aeroponik Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri*. Institut Teknologi Malang
- Syahputra, E., Rahmawati, M., dan Imran, S. 2014. Pengaruh Komposisi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Daun Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada. *Jurnal Florantek*. Vol 9 : (39-45)